

Καρκίνος του Προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη αναγνωρίζεται σήμερα ως ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανδρικός πληθυσμός. Στην Ευρώπη, είναι ο πιο συχνός καρκίνος, με ένα ποσοστό επίπτωσης 214 περιπτώσεις ανά 1000 άνδρες, υπερτερώντας αριθμητικά τις κακοήθειες των πνευμόνων και του παχέος εντέρου. Επιπλέον, είναι σήμερα η δεύτερη συνηθέστερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη συνδέεται με την ηλικία, και οι περισσότερες περιπτώσεις που διαγιγνώσκονται είναι σε άνδρες ηλικίας 70-79 ετών.

Ο πρώιμος καρκίνος του προστάτη δεν δημιουργεί συγκεκριμένα συμπτώματα, έτσι οι περισσότεροι άνδρες παρουσιάζουν συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Περίπου 10% των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη βρέθηκαν να έχουν καρκίνο του προστάτη μετά από ιστολογική εξέταση.

Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι σημαντική γιατί με τη σωστή αντιμετώπιση, ο ασθενής θεραπεύεται. Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του προστάτη συνίσταται στη δακτυλική εξέταση του προστάτη και στην εξέταση του ειδικού προστατικού αντιγόνου στο αίμα (PSA). Ο πρώτος έλεγχος πρέπει να γίνει στην ηλικία των 45 ετών. Ο μεταγενέστερος έλεγχος εξαρτάται από τα ευρήματα του πρώτου ελέγχου.

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη γίνεται με βιοψία του προστάτη, καθοδηγούμενη με διορθικό υπερηχογράφημα.

Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του προστάτη εξαρτάται από στάδιο στο οποίο εντοπίζεται. Ο πρώιμος καρκίνος του προστάτη αντιμετωπίζεται χειρουργικά με πολύ καλά αποτελέσματα.